Das Thierreich.

Zweiter Band.

Vögel. I. Schwimmvögel.

1. 2. Der gefleckte Pinguin. Aptenodytes (Spheniscus) demersa L. *Le manchot tacheté.*
Tab. I. Kopf, Fuß, Flügelfeder. — Südsee, besonders um Südafrika.

3. Der Halsband-Pinguin. Aptenod. (Sphen.) torquata Lath. *Manchot à collier.*
Neu-Guinea, Neu-Georgien, Kerguelen.

4. 5. Der kleine Pinguin. Apten. (Catarractes) minor Lath. *Petit Manchot.*
Neu Seeland.

6. Der rothbraune Pinguin. Apten. Catarractes (Catarr. brunnea). Forst. *Le Gorfou.*
Nach Temminck der junge Vogel folgender Art. — Südmeer.

7. Der Schopf-Pinguin. Apten. (Catarr.) chrysocoma Gm. *Le Gorfou sauteur, manchot sauteur, le Macaroni.*
Neuholland, Maluinen.

8. Der Papua-Pinguin. Apten. (Catarr.) papua Gm. *Manchot papou.*
Neu-Guinea, Falklands-Inseln, Papus.

9—11. Der Riesen-Pinguin. Apten. patagonia Gm. *Grand manchot, le grand Gorfou.*
11. Nestvogel aus der Schwägrichenschen Sammlung in Leipzig. Tab. I. Kopf mit Zunge.
Südmeer, Maluinen, Falklands-Inseln, Neuholland.

12—13. Der Brillen-Alk. Alca impennis L. *Le grand pingouin, ping. brachyptère.*
Ein Pärchen. — Im Eismeere.

14—16. Der Tord-Alk. Alca Torda L. *Le pingouin commun, ping. macroptère.*
Ein Pärchen nebst Nestvogel. — Tab. I. Schnabel, Fuß. — Im arctischen Ocean.

17. Der Zwerg-Alk. Alca (Phaleris) psittacula Pall. *Le starique psittacule, le starique perroquet.*
Südsee.

18. Der geschopfte Zwerg-Alk. Alca (Phal.) tetracula Pall. *Le starique tetracule.*
Soll der junge Vogel voriger Art seyn? Eigne Art nach Licht. — Tab. I. Schnabel.
Südsee.

19. 20. Der Federbusch-Zwerg-Alk. Alca (Phal.) cristatella Pall. *Le starique cristatelle.*
19. ist der junge Vogel: Alca pygmaea Gm.? Tab. I. Schnabel.
Japan, bis zur Behringsstraße.

21. 22. Der geschopfte Papagei-Alk. Alca (Mormon) cirrhata Lath. *Macareux à aigrette.*
22. jüngrer Vogel. — Meer um Kamtschatka und Nordamerika

23. 24. **Der eigentliche Papagei-Alk, Larventaucher.** Alca (Mormon) Arctica Gm. *Macareux moine.*
Tab. I. Kopf, Fuß. Nordküsten von Europa und Amerika.

25. **Der gehörnte Papagei-Alk.** Alca (Mormon) corniculata. *Macareux cornu.*
Küsten des nördl. stillen Oceans, vornehmlich die entlegnen Inseln.

26—30. **Die Troil-Lumme, das große Taucherhuhn.** Uria Troile Brünn. *Guillemot à gros bec.*
28. Wintervogel. 29. Nestvogel. 30. rothbraune Varität. Tab. I. 27. 30. Schnabel.
In den arctischen Meeren beider Continente.

31—33. **Die weißringige Lumme.** Uria Hringvia Brünn. *Guillemot lacrymant.*
32. Wintervogel. 33. jung. — Tab. I. 31. 32. Schnabel, Fuß. Im arctischen Ocean.

34. **Die langgeschnabelte Lumme.** Uria lomvia Brünn. *Guillemot à long bec.*
Tab. I. Schnabel. Im arctischen Ocean.

35. **Die Mandtische Lumme.** Uria (Grylle) Mandtii Lichtst. *Guillemot Mandt.*
Tab. I. Schnabel. Im arctischen Ocean.

36—40. **Die Gryll-Lumme.** Uria Grylle L. Grylle speculigera. *Guillemot grylle ou à miroir blanc.*
37. 39 und 40. Wintervögel: U. marmorata Lath. Tab. I. Schnabel, Fuß.
Im arctischen Ocean.

41—43. **Die Krabben-Lumme.** Uria (Mergulus) Alle Temm. *Le petit Guillemot ou Guill. nain.*
42. jung. 43. Wintervogel. — Tab. I. Kopf, Fuß. Im arctischen Ocean.

44—48. **Der rothkehlige Spitztaucher.** Colymbus septentrionalis Lath. *Plongeon Cat-marin.*
48. jung: Col. stellatus Gm. 47. C. striatus Gm. Nördliches Europa.

49—52. **Der Polar-Spitztaucher.** Colymbus arcticus L. *Plongeon Lumme, le Lumme.*
51. 52. jung: C. ignotus Bchst. Nördliches Europa.

53—56. **Der Eis-Spitztaucher.** Colymbus glacialis L. *Plongeon imbrim.*
55. 56. jung: Col. Immer. Gm. Nördliches Europa.

57—63. **Der Hauben-Lappentaucher.** Podiceps cristatus Lath. *Grèbe huppé.*
60. 61. Nestvögel. 62. 63. halbjähriger Vogel. Europa.

64—67. **Der rothhalsige oder graukehlige Lappentaucher.** Podiceps rubricollis Lath. *Grèbe sous-gris ou à joues grises.*
65. 66. Nestvögel. 67. einjähriger Vogel. Europa.

68. 69. **Der gehörnte Lappentaucher.** Podiceps cornutus Lath. *Grèbe cornu.*
69. jung: Col. obscurus Gm. Europa.

70. 71. Der arctische Lappentaucher. Podiceps arcticus Faber. *Grève arctique.*
71. Weibchen. Island, Norwegen.

72. 73. Der geöhrte Lappentaucher. Podiceps auritus Lath. *Grèbe oreillard.*
Europa, im östl., selten im mittl. Deutschland.

74. 75. Der Louisiana-Lappentaucher. Podiceps ludovicianus Lath. *Grèbe de la Louisiane.*
Luisiana.

76. 77. Der Carolina-Lappentaucher. Podiceps carolinensis Lath. *Grèbe cerclé ou à bec cerclé.*
Nordamerika.

78. Der Domingo-Lappentaucher. Podiceps dominicus Lath. *Grèbe de St. Domingue.*
St. Domingo, Brasilien.

79—84. Der kleine Lappentaucher. Podiceps minor Lath. *Grèbe castagneux.*
81. Nestvogel. 83. 84. junges Männchen. Im Norden beider Continente.

85—87. Der Nonnen-Sägetaucher. Mergus albellus L. *Harle Piette.*
87. Weibchen. Norden beider Continente.

88. Der Kronen-Sägetaucher. Mergus cucullatus Lath. *Harle couronné.*
Nordamerika.

89—92. Der langgeschnabelte Sägetaucher, Meerrachen. Mergus serrator L. *Harle huppé.*
89. altes Männchen. 90. Weibchen. 91. Nestvogel. 92. junges Männchen.
Norden beider Continente.

93—95. Der Gänse-Sägetaucher. Mergus merganser L. *Grand harle.*
95. junges Weibchen. Norden beider Continente.

96—100. Die Schellenente. Anas clangula L. *Le garrot, canard garrot, C. de Hongrie.*
97. u. 100 Weibchen. 98. junges Männchen: A. glaucion. L. Gm.
Norden beider Continente.

101. Die Epaulet-Schellenente. Anas scapularis Brhm. et Mehl. *Le garrot aux épaulettes.*
Island: See Myvatn.

102. 103. Die schmalgeschnabelte Schellenente. Anas angustirostris Brhm. *Le garrot à bec étroit.*
Braunschweig, Thüringen.

104. 105. Die dickköpfige Schellenente. Anas albeola L. *Le garrot ou le petit canard à grosse tête ou C. bucéphale.*
Nordamerika.

106—111. Die Kragenente. Anas histrionica L. *Canard à collier, Can. arlequin.*
108. Weibchen. 109. 110. Nestvögel. 111. junges Männchen.
Norden beider Continente.

112—115. Die Eisente. Anas glacialis L. *Canard de Miclou.*
112. junges. 115. altes Weibchen. 113. junges. 114. altes Männchen.
Norden beider Continente.

116—118. Die Kolbenente. Anas rufina Pall. *Canard siffleur huppé.*
116. Weibchen. Nordeuropa.

119—123. Die Schopf- oder Reiherente. Anas Fuligula L. *Canard morillon.*
120. Varietät. 122. Herbst-Weibchen. Norden beider Continente.

124—126. Die Tafelente. Anas ferina L. *Canard Milouin.*
Im Norden beider Continente.

127. Die Valisnerien-Ente. Anas Valisneriana Wils. *Canard de Valisnerie.*
Nordamerika.

128. 129. Die weißäugige Moorente. Anas Nyraca Gm. *Canard à iris blanc.*
128. Weibchen. Ost- und Nordeuropa.

130—132. Die Bergente. Anas marila L. *Canard Milouinar.*
131. Weibchen. Norden beider Continente.

133. 134. Die rothschimmernde Ente. Anas rubida (us) Wils. *Canard rougeatre changeant.*
A. cyanirostris Lchtst. aus Mexico. Am Delaware in Nordamerika.

135. 136. Die weißköpfige Ente. Anas leucocephala Lath. *Canard à tête blanche.*
Nordeuropa.

137—139. Die braune Moorente. Anas fusca L. *Canard double Macreuse.*
137. Männchen im Spätherbst. 138. Weibchen im Spätherbst. 139. jung. Männchen.
Norden beider Continente.

140—144. Die schwarze Moorente. Anas nigra L. *Canard Macreuse.*
140. 142. Männch. und 144. Weibch. im November. 141. 143. Männch. im Frühling.
Norden beider Continente.

145. Die amerikanische Brillenente. Anas perspicillata L. Gm. *Macreuse à large bec* Buff. *à lunettes, grande Macr. de la Baye de Hudson* Briss.
Nordküsten von Amerika: Nootka Sund.

146. Die Lappenente. Anas lobata Shaw. *Canard caronculé.*
Neuholland.

147—150. Der Königs-Eider. Anas spectabilis L. Gm. *Canard à tête grise* Buff.
147. 148. Männch. 149. Weibch. 150. M. jung. Norden beider Continente.

151—158. Die Eiderente, Eidergans. Anas mollissima L. *L'oie à duvet, l'Eider, Canard Eider.*

151. 152. Männchen. 153. 154. Weibchen. 155. 156. Nestvogel. 157. Abart: Somateria norvegica Brehm. 158. diese jung. Norden beider Continente.

159. Die Sichelente. Anas falcaria Gm. L. *Canard aux ailes en faucille.*

Weibchen aus Kamtschatka. China, Kamtschatka.

160. 161. Die Labrador-Ente. Anas labradoria Lath. *Canard de Labrador.*

Männchen und Weibchen. Nordamerika.

162—164. Die Schnatterente. Anas strepera L. *Canard chipeau.*

162 und 164. Männchen und Weibchen aus Europa. 163. amerikan. Männchen. Europa und Nordamerika.

165. Die amerikanische Schnatterente. Anas americana Gm. L. *Le Canard d'Amerique, canard Jensen.*

Nordamerika.

166. Die rothseitige Schnatterente. Anas pyrrhoplagia Pöpp. *Canard à flancs rouges.*

Chili.

167. Die mexicanische Schnatterente. Anas icariotis Lchtst.

Mexico.

168—170. Die Pfeifente. Anas penelope L. *Le siffleur.*

Vorzüglich im nördlichen Europa.

171. Die Bogenente. Anas arcuata Horsf. *Canard arqué.*

Java.

172—173. Die rothgelbe Ente. Anas rutila Pall. (Anas kasarka Gm.)

Orient, Osteuropa.

174. Die Herbstente. Anas autumnalis L. *Canard siffleur à bec rouge.*

Südamerika.

175. Die dunkle Ente. Anas obscura Gm. L. *Canard obscur.*

Nordamerika.

176—177. Die Mondente. Anas discors L. *Canard Sarcelle de Cayenne ou Soucrourou.*

176. Männchen. 177. Weibchen. Mexico, Cayenne.

178. Die Blauschulterente. Anas coerulata Lath. *Canard Sarcelle à epaulettes bleues.*

Mexico.

179. Die Paturi-Ente. Anas Paturi Spix. *Canard Patouri.*

Brasilien.

180. Die Wittwenente. Anas viduata L. *Canard à petit bec.*

Südamerika.

181. Die Schnabelfleckente. Anas maculirostris Lichtst. *Canard Sarcelle à bec tacheté.*
Montevideo.

182. Die Weißkehlente. Anas bahamensis L. *Canard Sarcelle de Bahama.*
Bahamische Inseln, Brasilien.

183—185. Die Knäkente. Anas querquedula L. *La Sarcelle ordinaire* ou *Canard Sarcelle d'été.*
185. Weibchen. Europa.

186—187. Die Kriekente. Anas crecca L. *La Sarcelle d'hiver.*
187. Weibchen.

188—189. Die amerikanische Kriekente. Anas carolinensis Gm L. *La Sarcelle d'hiver d'Amerique.*
Nordamerika.

190—193. Die Brautente. Anas sponsa L. *Le Canard de Caroline.*
192. Weibchen. 193. junger Vogel.
Von Florida bis zum See Otario in den vereinigten Staaten.

194—195. Die Mandarinente. Anas galericulata L. *Canard Sarcelle de la Chine.*
China.

196. Die Nelkenente. Anas caryophyllacea Lath. *Canard à tête couleur de canelle.*
Ostindien.

232. Die türkische Ente, wild. Anas moschata L. *Canard musqué.*
Brasilien.

197. 198. Die türkische Ente, zahme Varietät. Anas moschata L. var. domestica. *Canard musqué domestique.*
Gezähmt.

233. Bastard der türkischen und Stockente. Anas moschata ⨯ boschas.

199—202. Die Stockente. Anas boschas L. *Canard ordinaire.*
201. Weibchen. 202. Nestvogel. Europa und Nordamerika.

203—204. Die Schillerente. Anas boschas corruscans. *Canard changeant.*
An der Elbe und am Rhein.

205—212. Die zahme Ente. Anas boschas domestica. *Canard ordinaire domestique.*

213—214. Die Krummschnabelente. Anas adunca L. *Canard à bec courbé.*
Holland.

215—217. Die Löffelente. Anas clypeata L. *Canard Souchet.*
216. junges Männchen. 217. Weibchen. Norden von Europa und Amerika.

218—219. Die Spießente. Anas acuta L. *Canard à longue queue.*
219. Weibchen. Norden von Europa und Amerika.

220. Die Spitzschwanzente. Anas oxyura Lichtst. *Canard à queue aigue.*
Südamerika.

221—223. Die Brandente. Anas Tadorna L. *Canard Tadorne* ou *Canard Renard.*
222. Weibchen. 223. jung. Nord- und Westeuropa.

224—226. Die Schneeente. Anas hyperborea L. Gm. *L'oie hyperborée.*
225. Weibchen. 226. jung. Männchen. Norden von Europa und Amerika.

227. Die Höckerschnabelgans. Anas melanotos Gm. L. *L'oie bronzée à crête sur le bec.*
Ostindien.

228. Die Bernakelgans. Anas bernicla L. *Oie cravant.*
Norden von Europa und Amerika.

229. Die weißwangige Gans. Anas leucopsis Bchst. (erythropus Gm. L.) *Oie Bernache.*
Nordeuropa.

230. Die Rothhalsgans. Anas ruficollis Pall. (torquata Gm. L.) *Oie à cou roux.*
Nordasien und Nordeuropa.

231. Die Brillenente. Anas perspicillata L.
Beßre Abbildung als 145, nach einem erst später erhaltenen schönen Exemplare.

232. Die wilde türkische Ente.
Erklärung siehe nach No. 196.

233. Bastard aus der türkischen und Stockente.
Erklärung siehe nach No. 198.

234—235. Die Mähnengans. Anser jubatus Spix. *Oie à crinière.*
Brasilien.

236—237. Die ägyptische Gans. Anser aegyptiacus (L.) *Oie d'Egypte.*
Nordafrika.

238—239. Die Weißstirngans. Anser albifrons Bchst. *Oie rieuse.*
Norden von Europa und Amerika.

240—241. Die Saatgans. Anser segetum Meyer. *Oie des moissons.*
Nordeuropa.

242—243. Die Graugans. Anser cinereus Meyer. *Oie cendrée, sauvage.*
Nordeuropa.

244—245 b. Die zahme Gans. Anser ciner. domesticus. *Oie domestique.*

246. Der Spornschwan, Gambiagans. Cygnus gambensis (L.) *Cygne de Gambie.*

Afrika, Gambia.

247—248. Der Cravattenschwan. Cygnus canadensis (L.) *Cygne à cravatte.*

Canada.

249—250. Der schwarze Schwan. Cygnus plutonius (Shaw, Anas atrata Lath.) *Cygne noir.*

Neuholland.

251. Der Gänseschwan, Schwanengans. Cygnus guineensis (Anas cygnoides L.) *Cygne de Guinée.*

Guinea.

252. Der Schwarzhalsschwan. Cygnus nigricollis (Lath. et Anas melanocephala Molin. Gm. L.) *Cygne à tête et cou noire.*

Im südlichsten Amerika.

253. Der Singschwan. Cygnus ferus Briss. *Cygne sauvage ou à bec jaune.*

Norden von Europa und Amerika.

254. Der Stummschwan. Cygnus Olor Illg. *Cygne à bec rouge ou domestique.*

Europa.

255. Der Wachsschnabel. Cereopsis Novae Hollandiae Lath. *Céréopse de la Nouvelle Hollande.*

Neuholland.

256. Der schwarze Scheerenschnabel. Rhynchops nigra L. *Bec en ciseaux noir.*

Antillen.

257. Der grauliche Scheerenschnabel. Rhynchops cinerascens Spix. *Bec en ciseaux cendré.*

Amazonenfluß.

258. Der kurzschnäbelige Scheerenschnabel. Rhynchops brevirostris Spix. *Bec en ciseaux court-bec.*

Junger des Vorigen? Amazonenfluß.

259. Großschnabelige Seeschwalbe. Sterna magnirostris Lichtst. *Sterne à grand bec, Hatis à tête noire Azar.*

St. Francisco in Brasilien.

260. Die kaspische Seeschwalbe. Sterna caspia Gm. *Sterne caspienne.*

Kaspisches Meer, Ostsee.

261. Die engländische Seeschwalbe. Sterna anglica Montagu. *Sterne Hansel.*

Norden von Europa und Amerika.

262. Die kentische Seeschwalbe. Sterna cantiaca ALBIN. *Sterne de Kent.*
England. Nordeuropa.

263. Die Bergische Seeschwalbe. Sterna Bergii LICHTST. *Sterne Berg.*
Vorgebirge d. g. Hoffnung.

264. Die cayennische Seeschwalbe. Sterna cayennensis GM. L. *Sterne de Cayenne.*
Cayenne.

265. Die schnelle Seeschwalbe. Sterna velox RÜPP. CRTZSCHM. *Sterne rapide.*
Vom rothen Meere bis Cap.

266. Die ähnliche Seeschwalbe. Sterna affinis RÜPP. CRTZSCHM. *Sterne voiçine.*
Ebenso.

267. Die Silber-Seeschwalbe. Sterna argentata BR. *Sterne argenté.*
Ostsee.

268—271. Die gemeine Seeschwalbe. Sterna hirundo L. *Sterne, hirondelle de mer, Pierre-Garin.*
Europa u. Nordamerika.

272—275. Die arctische Seeschwalbe. Sterna arctica TEMM. *Sterne arctique.*
Im höchsten Norden von Europa u. Amerika.

276. Die schwarzbäuchige Seeschwalbe. Sterna melanogastra TEM. *Sterne à ventre noir.*
Ostindien, Ceylon, Java.

277. Die schwarznackige Seeschwalbe. Sterna melanauchen TEMM. *Sterne à nuque noire.*
Molukken, Küsten von Celebes.

278—281. Die kleine Seeschwalbe. Sterna minuta L. *Petite Sterne ou hirondelle de mer.*
Europa u. Nordamerika.

282. Die Schnurrbart-Meerschwalbe. Sterna leucopareija NATT. *Sterne Monstac.*
Südeuropa (Ungarn, Triest).

283. Die weißflügelige Meerschwalbe. Sterna leucoptera TEMM. *Sterne leucoptère.*
Am adriatischen und mittelländischen Meere.

284. 285. Die schwarze Seeschwalbe. Sterna nigra L. *Sterne epouvantail.*
Norden u. Osten von Europa, Nordamerika.

286. Die Inca-Seeschwalbe. Sterna Inca LESS. et GARN. *Sterne des Incas.*
Küsten von Peru, vorzügl. Insel St. Lorenzo.

287. Die Noddi-Seeschwalee. **Sterna stolida** Lath. *Le Noddi, oiseau fou.*
Cayenne, Tropenküsten bis Südsee, stilles Meer, Neuholland.

288. Die dünnschnabelige Seeschwalbe. **Sterna tenuirostris** Temm. *Sterne à bec grêle.*
Westküste von Afrika, Senegal.

289. 290. Die kleine Möve. **Larus minutus** L. *Mouette pygmée.*
290. jung. Europa.

291. Die schwarzschnabelige Möve. **Larus melanorhynchos** Temm. *Mouette à bec noir.*
Chili.

292. 293. Die braunmaskirte Möve. **Larus capistratus** Temm. *Mouette à masque bonn.*
Im hohen Norden.

294. Die Kaputzenmöve. **Larus cucullatus** Lchtst. *Mouette à capuchon.*
Mexico.

295. Die weißäugige Möve. **Larus leucophthalmos** Lchtst. *Mouette à iris blanc.*
Am rothen Meer.

296. Die Huthmöve. **Larus pileatus** Br. *Mouette à chapeau.*
Dänische Inseln.

297. 298. Die Lachmöve. **Larus ridibundus** L. *Mouette rieuse.*
Europa.

299. 300. Die schwarzköpfige Möve. **Larus atricilla** L. *Mouette à tête noire, à capuchon plombé.*
Nord- u. Südamerika.

301—303. Die dreizehige Möve. **Larus tridactylus** Lath. *Mouette à trois doigts.*
303. jung. Norden von Europa.

304. Die Elfenbeinmöve. **Larus eburneus** L. *Mouette blanche.*
Im höchsten Norden von Europa u. Amerika.

305. 306. Die nordische Sturmmöve. **Larus canus** L. *Mouette à pieds bleus.*
Nordeuropa.

307. 308. Die Heringsmöve. **Larus fuscus** L. *Mouette à pieds jaunes.*
Norden von Europa, Ostsee.

309. Audouins Möve. **Larus Audouinii** Payr. *Mouette d'Audouin.*
Sardinien, Corsika.

310. 311. Die weißschwingige Möve. **Larus leucopterus** Fabr. *Mouette leucoptère.*
311. jung. Grönland, Island.

312. 313. Die Silbermöve. Larus argentatus LATH. *Mouette à manteau argenté.*
313. jung. Nordeuropa.

314. 315. Die Bürgermeistermöve. Larus glaucus L. *Mouette Bourguemestre, Goëland.*
315. jung. Nordeuropa.

316. Die schwarzgeschwänzte Möve. Larus melanurus TEMM. *Mouette ou Goëland à queue noire.*
Japan, Corea.

317. 318. Die Schwarzmantelmöve. Larus marinus L. *Mouette ou Goëland à manteau noir.*
Nordeuropa.

319—323. Die Schmarotzer-Raubmöve. Lestris parasitica BOJ. *Le Labbe à longue queue.*
320 u. 323. jung. Nordeuropa.

324. Büffons Raubmöve. Lestris Buffonii BOJ. *Le Labbe Buffon.*
Grönland.

325. Benicke's Raubmöve. Lestris Benickii BR. *Le Labbe Benicke.*
Faröe u. benachb. Inseln, Nordeuropa.

326. 327. Die Felsenraubmöve. Lestris crepidata BR.
Junge Vögel von L. parasitica?, am Elbufer gefangen.

328. Die breitschwänzige Raubmöve. Lestris pomarina TEMM. *Stecoraire pomarin.*
Norwegen, Island.

329—331. Die Riesenraubmöve. Lestris catarractes ILLG. *Stercoraire cataracte.*
Island, Hebriden, Faröer Inseln.

332. Der Riesensturmvogel. Procellaria gigantea LATH. *Pétrel géant.*
Südmeer.

333. 334. Der Eissturmvogel. Procellaria glacialis L. *Pétrel Fulmar.*
Eismeer.

335. Der Harlik. Procellaria hasita FORST. *Pétrel harlic.*
Südsee.

336. Der Cap-Sturmvogel. Procellaria capensis LATH. *Pétrel Damier.*
Südafrika.

337. Berard's Sturmvogel. Procellaria Berardi QUOY. et GAIM. *Pétrel Berard.*
Malouinen.

338. 339. Der kleine Sturmvogel. Procellaria (Thalassidroma) pelagica L. *Pétrel de tempète.*
Ocean.

340. (vgl. 388.) **Wilson's Sturmvogel.** Procellaria (Thalassidroma) Wilsonii Bonap. *Pétrel de Wilson.*
Nördlicher Ocean.

341. Sturmvogel Englands. Procellaria (Puffinus) Anglorum Temm. *Pétrel de Manks.*
Ocean.

342. Der bläuliche Sturmvogel. Procellaria (Pachyptila) vittata Gm. L. *Pétrel bleu.*
Südl. Breite 58°.

343. Der Tauchersturmvogel. Procellaria (Halodroma) Urinatrix Gm. *Puffinus de Gornot.*
Küsten von Peru.

344. 345. Der Riesen-Albatros. Diomedea exulans L. *L'albatros commun, le mouton de Cap.*
345. junger Vogel. Um Südafrika.

346. Der Augenbraunen-Albatros. Diomedea melanophrys Temm. *Albatros à sourcils noirs.*
Südafrika.

347. Der Grünschnabel-Albatros. Diomedea chlorochynchos Lath. *Albatros chlorochynque.*
Südmeer.

348. Der Ruß-Albatros. Diomedea fuliginosa Temm. *Albatros fuligineux.*
Südmeer.

349. Der rothschwänzige Tropikvogel. Phaëton phoenicurus Gm. L. *Paille en queue ou phaéton à brius rouges.*
Ostindische Meere.

350. 351. Der weißschwänzige Tropikvogel. Phaëton aethereus Gm. L. *Paille en queue ou phaéton à brius blanches.*
351. junger Vogel. Atlantischer Ocean, Südmeer.

352. 353. Le Vaillants Anhinga. Plotus Le Vaillantii Temm. *Anhinga Le Vaillant.*
353. junger Vogel. Senegal, Vorgeb. d. g. H. und ein Theil von Asiens Küsten.

354. 355. Der schwarze Anhinga. Plotus Anhinga L. *Anhinga noir.*
355. Weibchen. Im tropischen und nördlichen Amerika.

356—358. Der weiße Tölpel. Sula Bassana Briss. *Fou de Bassan.*
Faröer Inseln, Orkaden, Hebriden bes. die Insel Baß.

359. Der schwarze Tölpel. Sula fusca Briss. *Fou noiratre.*
Antillen.

360. Der brasilianische Tölpel. Sula brasiliensis Spix. *Fou de Brésil.*
Auf den Inseln bei der Stadt Rio de Janeiro.

361. Der kleine Tölpel. Sula parva Gm. Cus. *Petit Fou.*
Cayenne.

362—364. Der große Kormoran Halieus Carbo Illig. *Le Cormoran.*
362. Männch. 363. Weibch. 364. junges Männchen. Im hohen Norden, von da an den Küsten d. Nord- u. Ostsee, einzeln bis Mitteldeutschland.

365. Der gehäubte Kormoran. Halieus cristatus Olafs. (graculus Mey. Temm.) *Le Cormoran huppé, C. largup.*

Im hohen Norden, Island, Faröer Inseln, Orkaden u. Hebriden, einzeln bis Brunsbüttel gekommen.

366. Der büschelöhrige Kormoran Vieillots. Halieus naevius Lath. L. (punctatus Lath. Hydrocorax dilophus Vicill.) *Cormoran dilophe Vicill.*

Neuseeland.

367. Der büschelöhrige Kormoran Cüviers. H. bilophus Cuv. bei Guerin. *Cormoran oreillé.*

Im hohen Norden.

368. 369. Der brasilianische Kormoran. H. brasilianus (Carbo bras.) Spix. *Cormoran du Brésil.*

In Brasilien, im See Coari.

370. Gaimards Kormoran. H. Gaimardi Garnot et Cess. *Cormoran Gaimard.*

Küsten von Peru, bei Callao und auf den Felsen um die Insel St. Lorenzo.

371. Der Zwerg-Kormoran. H. pygmaeus Pall. *Cormoran pygmé.*

Am kaspischen Meere, Küsten von Osteuropa, Ungarn, auf der Donau.

372. 373. Der braunköpfige Fregatvogel. Tachypeter Aquilus Illig. *La Frégate.*

Männchen u. Weibchen. An d. Küsten v. Amerika, im Atlantischen u. stillen Ocean.

374. 375. Der weißköpfige Fregatvoget. Tachypeter leucocephalus (Pelec.) Buff. *La Frégate à tête blanche.*

Alt u. jünger. Dasselbe Vaterland, unser Expl. 374. von den Küsten Neuhollands.

376. 377. Der Schopf-Pelikan, Kropfgans. Pelecanus Onocrotalus Linn. *La Pélican blanc ou rose.*

377 junger Vogel: Philippenois Briss. Ostküsten von Europa, Asien u. Afrika.

378. 379. Der frisirte Pelikan. Pelecanus crispus Feldegg. *La Pélican frisé.*

Küste von Dalmatien.

380. 381. Der Brillen-Pelican. Pelecanus perspicillatus Temm. *Le Pélican à lunettes.*

Küsten Australiens.

382. 383. Der schwarzbraune Pelikan. Pelecanus fuscus Vicill. *Le Pélican brun.*

382 ist Büffons, 383 Cuviers Vogel. Amerika, auf den Strömen, auf den Antillen, im Südmeere.

384—386. Der röthliche Pelikan. Pelecanus rufescens Lath. *Le Pélican rougeate.*

384. 385. unser Vogel (Weibchen?) 386. Rüppels Vogel. Afrika.

387. Die Adlermöve. Larus ichthyaetor Pall. *La Mouette aigle des poissons.*

Im Ganges, dem rothen u. kaspischen Meere.

343. Garnot's Sturmvogel. Procellaria (Halodroma) Urinatrix Illg. *Le Puffinure de Gàrnot (Puffinuria Garnotii Lesson.)*
Supplement zu Taf. 27. Küsten von Peru.

388. Wilsons Sturmvogel. Procellaria (Thalassidroma) Wilsonii Bonap. *Pétrel Wilson.*
Nordamerika.

389. Leach's Sturmvogel. Procellaria (Thalassidroma) Leachii Temm. *Pétrel Leach.*
St. Kilda.

390. Der schönwangige Lappentaucher. Podiceps Kallipareus Less. Garnot. *Grèbe à joues belles, à calotte noire Less. Petit plongeon à lunettes Pernetty.*
Pod. occipitalis Lesson, Malouinen.

391. Rolland's Lappentaucher. Podiceps Rollandi Quoy et Gaimard. *Grève Rolland.*
Malouinen.

392. 393. Der Spornschwan, Gambiagans. Cygnus gambensis (L.) *Cygne de Gambie.*
Supplem. zu Abb. 246. Männchen u. Weibchen. Afrika. Gambia.

394. Die Kurzflügelente. Anas brachyptera Lath. *Canard à ailes courtes.*
Malouinen.

395. Die Radjah-Ente. Anas Radjah Less. *Canard Radjah.*
A. leucomelas Garnot. Buru.

396. Die dunkle Brandente. Anas tadornoides Will. Jard. *Canard Tadornoide.*

397. Die antarktische Gans. Anser antarcticus (Anas) Lath. *Oie antarctique.*
Malouinen.

398. 399. Die Weißstirngans. Anser albifrons Bchst. *Oie rieuse.*
Junge Vögel bei Schandau in Sachsen geschossen, zu 238. 239. Norden von Europa und Amerika.

400. 401. Der schwarze Scheerenschnabel. Nachträge zu 256.

402. Der orientalische Scheerenschnabel. Rhynchops orientalis Ruepp. *Becen ciseaux de l'Orient.*
Rh. albirostris Lichtst. Am Nil.

403. Der Papageiartige Regenalk. Ombria psittacula Eschsch. (Zu 17.)

404. Der gehörnte Winteralk. Chimerina cornuta Eschsch. *Chimerine cornue.*
Insel St. Paul, im kamtschatkischen Meere.

405. Der kurzschwänzige Albatros. Diomedea brachyura Temm. *Albatros courte-queue ou trapu.*
Ga-ran-tsjoo der Japaner. Ostküste von Japan, um die Liou-Kiou Inseln nach Süden hin.

406. Die Bergente aus Neuholland. (zu 130.) Weibchen.

407. 408. Die scheckbrüstige Schopf-Ente. Anas poecilothorax Rchb. *Canard morillon à poitrine tachetée.*
Männchen und Weibchen. Neu-Holland.

Sumpfvögel oder Stelzvögel.

---

417. Der rothe Flamingo. Phoenicopterus ruber Latham. *Le Flammant rouge.*
Südamerika.

418. 419. Der Flamingo der Alten. Phoenicopterus antiquorum Temm. *Le Flammant des anciens.*
419. Das Weibchen im Brüten, auf dem thurmförmigen Neste reitend. Afrika, Sardinien, Küsten Südeuropa's.

420. Der kleine Flamingo. Phoenicopterus minor. Vieill. *Le Flammant gygmée.*
Südafrika.

421—423. Der weiße Löffler. Platalea leucorhodia L. *La Spatule blanche.*
Holland und Ungarn.

424. Der Schwarzschnabel-Löffler. Platalea melanorhynchos Rchb. *La Spatule à bec noir.*
Neuholland.

425. 426. Der Rosa-Löffler. Ptatalea Ajaia L. *La Spatule rose.*
425. Das hochzeitliche Männchen. Südamerika.

427. Der graue Kranich. Grus cinerea Bchst. *Grue cendrée.*
Europa.

428. Der Halsband-Kranich. Grus torquata (Ardea) Gmel. *Grue à collier.*
Ostindien.

429. Der Straußen-Kranich. Grus Struthio Voigt. *Grue Autruche.*
Ardea et Grus americana Wils. Amerika.

430. Der kleine weiße Kranich. Grus leucogeranos Temm. *Grue leucogérane.*
Sibirien bis Japan.

431. Der Kehllappen-Kranich. Grus carunculata Vieill. *Grue caronculée.*
Ardea carunculata Lath. Südafrika.

432. Der Mönchs-Kranich. Grus monacha Temm. *Grue moine.*
Japan.

433. Der weißhalsige Kranich. Grus leucauchen TEMM. *Grue à nuque blanche.*
Japan.

434. Der Schnepfen-Kranich. Aramus scolopaceus VIEILL. *Le Courlon ou Courliri.*
Ardea Scolopacea GM. Guarauna MARCGR. Amerika.

435. Die numidische Jungfrau. Anthropoides virgo VIEILL. *La Demoiselle de Numidie.*
Ardea virgo L. Grus virgo CUV. Afrika.

436. Der Pfauen-Kranich, Königsvogel. Anthropoides pavonius VIEILL. *L'oiseau royal ou grue couronnée.*
Ardea pavonina L. Grus — CUV. Westafrika.

437. Stanley's Pfauen-Kranich. Anthropoides Stanleyanus VIGORS. *Anthropoide de Stanley.*
Ostindien.

438. Der plattenfederige Klaffschnabel. Anastomus lamelliger TEMM. *Bec-ouvert à lames.*
Vorgeb. d. g. Hoffnung.

439. Der weiße Klaffschnabel. Anastomus typus TEMM. *Bec-ouvert des Indes.*
Continent Ostindiens.

440—442. Der Kibitzreiher. Dromas Ardeola PAYK. *Drome Ardéole.*
Erodia amphilensis SALT. — 442. Der jüngere Vogel. Am rothen Meere, An den Küsten Indiens, besonders Bengalens.

443. Der amerikanische Jabiru. Mycteria americana L. *Le Jabiru de Cayenne.*
Südamerika.

444. Der afrikanische Jabiru. Mycteria senegalensis LATH. *Le Jabiru du Sénégal, Cicogne bec-selle* TEMM.
Ciconia ephippiorhyncha CRETZSCHM. Westküste von Afrika.

445. Der neuholländische Jabiru. Mycteria australis LATH. *Le Jabiru de la Nouvelle Hollande.*
Neuholland.

446. Der frisirte Marabu. Marabus capillatus RCHB. *Le Marabou frisé.*
Ciconia capillata TEMM. Cic. Javanica HORSF. Java, Sumatra.

447. Der Adjutant. Marabus Argala RCHB. *Le Marabou Argale.*
Ciconia Argala LATH. Ardea dubia GMEL. Indien, malayische Inseln.

448. Der ächte Marabu. Marabus plumiger RCHB. *Le Marabou aux parures.*
Ciconia Argala TEMM. Senegal, Inneres Afrika.

449. 450. Der weiße Storch. Ciconia alba BRISS. *La cicogne blanche.*
Ardea ciconia L. Europa, Afrika.

451. 452. Der amerikanische Storch. Ciconia Maguari VIEILL. *La Cicogne Maguari.*
Cic. americana BRISS. Cic. Jaburù SPIX. Südamerika, einzeln in Europa.

453. 454. **Der schwarze Storch.** **Ciconia nigra** BCHST. ***La Cicogne noire.***
Cic. fusca BRISS. Türkei, Ungarn, Polen und mehrere Gegenden Deutschlands.

455. **Der Abdimische Storch.** **Ciconia Abdimii** LICHTST. ***La Cicogne Abdimii.***
Aegypten und Afrika's Westküsten.

456. **Der weißhalsige Storch.** **Ciconia leucocephala** GM. ***Cicogne à cou blanc.***
Südafrika bis Indien.

457. 458. **Der Riesen-Reiher.** **Ardea Goliath** TEMM. ***Le Héron Goliath.***
458. Der jüngere Vogel. Afrika.

459. 460. **Der Herodias-Reiher.** **Ardea Herodias** LINN. ***Le Héron Hérodias.***
459. Hochzeitlicher Vogel. Nordamerika.

461. **Der Cocoi-Reiher.** **Ardea cocoi** LATH. ***Le Héron Cocoi.***
Fälschlich Ardea Maguari bei SPIX. Brasilien.

462—464. **Der graue Fisch-Reiher.** **Ardea cinerea** LATH. ***Le Héron cendré.***
Europa.

465. **Der Flöten-Reiher.** **Ardea sibilatrix** TEMM. ***Le Héron Flute du soleil.***
Héron Curahi-Remimbi. In den Pampa's von Paraguay in Brasilien.

466. **Der Typhon-Reiher.** **Ardea Typhon** TEMM. ***Le Héron Typhon.***
Gambia.

467—469. **Der Purpur-Reiher.** **Ardea purpurea** L. ***Le Héron pourpre.***
Südeuropa.

470. 471. **Der Agami-Reiher.** **Ardea Agami** L. ***Le Héron Agami de Cayenne.***
471. Der junge Vogel. Cayenne.

472. **Der schwarze Reiher.** **Ardea Novae-Guineae** LATH. ***Le Héron de la Nouvelle Guinée.***
A. nigerrima WAGL. Neu-Guinea.

473. **Der Südsee-Reiher.** **Ardea pacifica** LATH. ***Le Héron Bullaragang.***
Ardea Bullaragang WAGL. Neuholland.

474. **Der weiße Reiher.** **Ardea alba** GMEL. ***Le Héron blanc.***
Am kaspischen und schwarzen Meere, der Türkei, in Griechenland, Rußland, Polen, Ungarn, Sardinien. Kommt einzeln nach Deutschland. — Jüngerer Vogel.

475. **Der kleine Silber-Reiher.** **Ardea Garzetta** L. ***Héron Garzette, la petite Aigrette.***
A. candidissima et nivea GMEL. Asien, Afrika, Südeuropa.

476. **Der große Silber-Reiher.** **Adea Egretta** L. ***Héron Aigrette.***
Ardea leuce ILLIG. A. alba BONAP. Amerika, Guiana bis Neujork.

477. Der schneeweiße Reiher. Ardea candidissima JACQ. *Le Héron blanc de neige.*
A. xanthodactyla et alba TEMM. Südamerika, als Zugvogel in Nordamerika.

478. Der röthlichgeschmückte Reiher. Ardea rufescens L. *Héron Aigrette rousse.*
Nordamerika.

479. 480. Der Weißbauch-Reiher. Ardea leucogaster LATH. *Héron Aigrette bleuatre à ventre blanc.*
A. ludoviciana WILS. Cayenne, Süd-Carolina, Neu-Orleans.

481. Der schwarzblaue Reiher. Ardea coerulescens LATH. *Héron Aigrette bleuâtre, le crabier bleu* BUFF.
Cajenne.

482. 483. Der Nachtreiher. Ardea nycticorax L. *Le Bihoreau.*
483. Junger Vogel: A. maculata GM. Europa, mehr südlich, Afrika, Java.

484. Der Gardenische Nachtreiher. Ardea Gardeni MONT. *Le Bihoreau d'Amerique.*
Nycticorax Gardeni BONAP. Nord- und Südamerika.

485. Der Caledonische Nachtreiher. Ardea caledonica FORST. *Le Bihoreau caledonien.*
A. Sparmanni WAGL. Neu-Caledonien, Neu-Holland.

486. 487. Der Hutreiher. Ardea pileata LATH. *Le Héron huppé de Cajenne.*
Cajenne, Guiana, Brasilien.

488. Der Cajenne-Reiher. Ardea cajennensis BUFF. *Le Bihoreau de Cajenne.*
A. violacea et Nycticorax violacea BONAP. Südcarolina, Georgien, Luisiana, Bahama-Inseln, bis Virginien.

489. 490. Der grünliche Reiher. Ardea virescens L. *Le Crabier de la Luisiane.*
Guiana, Cajenne, Martinique, Jamaika, Nordamerika.

491. Der Schulterfleck-Reiher. Ardea scapularis ILLIG. *Le Héron à couleur de plomb* AZARA.
Brasilien, Cajenne, Paraguay, Sumatra, Java, Senegambien.

492 — 494. Der Rallen-Reiher. Ardea ralloides SCOP. *Le Crabier Caiot.*
A. comata, Squaiotta, castanea. Aegypten, Nubien, Südeuropa, benachbartes Asien.

495. Der zimmetfarbige Reiher. Ardea cinnamomea GM. *Le Crabier couleur de canelle, Ayam-ayamam* JAVANOR.
A. bilineata et A. australis CUV. nebulosa HORSF. China, Java.

496—497. Die kleine Rohrdommel. Ardea minuta L. *La Blongios de Suisse* BUFF.
A. danubialis et A. soloniensis. Europa, Sibirien, Arabien, Syrien, Nubien.

498—499. Die amerikanische kleine Rohrdommel. Ardea exilis LATH. *Le héron varié* AZARA.
A. variegata VIEILL. A. involucris ENCYCL. Nordamerika, Jamaica, Paraguay.

1.
9.
14.
18.
19.
20.
24.
41.
27.
34.
31.
32.
40.
36.

4. 5. 2. 3. 1.
7. 6.
10. 11. 9. 8.

18.
19. 20.
21.
25.

29.
30.
26.
27.
28.
34.
35.
31.
33.
32.
39.
41.
42.
43.
36.
37.
38.
40.

47.
44.
48.
45.
46.
49.
51.
52.
50.
56.
54.
53.
55.

88.
85.
86.
87.
90.
91.
89.
92.
94.
93.
95.



96. 97. 98. 100. 99.

101. 102. 103.

105. 104.

109. 106. 107. 110. 108. 111.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.


124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.



137. 138. 139.



141. 140. 142. 143. 144.



145. F.A.S. 146.



148. 147. 149.

157. 150. 158.

151. 154. 155. 156. 152.

166.
160.
161.
159.
167.
162.
165.
164.
163.
170.
169.
168.

173.
171.
172.
174.
180.
178.
176.
179.
175.
177.
183.
181.
184.
185.
182.
188.
189.
187.
186.



190. 191. 192. 193.

194. 195.



196. 197. 198.

199.
202.
201.
200.
204.
203.
210.
206.
205.
211.-12.
207.
208.
209.
213.
214.

215.
216.
217.
219.
218.
223.
222.
221.
220.

224
225
226
227
228
229
230
231
233
232



18



240. 247. 248.

449. 250. 249.

254. 253. 252.



255.

256.

257.

258.

259.

260.



G.A.f. 21.


274
272.
273
275.
276
277.
281.
278
279.
280
282.
284.
283.
285.
287.
286
288.

22

289
290
291
292
293
295
294
296
298
297
300
299
301
303
302
23


304
305.
306
307.
308
309.
311.
310.



313. 312. 315. 314.



316. 318. 317.

26


332.
333. 334.
335.
337.
336.
338.
340.
339.
341.
342.

G.A.S. 28



29



357. 356. 358.

359. 360.

361

G.K.f



SKP. 31



376 377

378 379



380 381

383 382

384 385 S.J.S. 37

386.



387. 343.

390. 391. 388. 389.

35


394
393
393
395
396
398
399
36

400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407
408



409. 410.



411.

412.



413.

414. 415.

416.

C. Schnorr sc.


394
393
393
395
396
398
399
36

400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.



409. 410.



411.

412.



413.

414. 415.

416.

C. Schmerr sc.

38.

39.


429.
427.
428.
432.
434.
433.
431.
430.

437. 436. 435.



438. 439. 440. 441. 442.

42.

449. 450. 452. 451.

454. 453.

455.

456.

458.
457.
460.
459.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468
469.
470.
44.

472. 473. 471.

474. 475. 476. 477.

478. 479. 480. 481.

482. 483. 484. 485.

486. 487. 488

489. 490. 491.

BSB Bayerische StaatsBibliothek

MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Reichenbach, Ludwig, 1793-1879

Der Naturfreund oder praktisch-gemeinnützige Naturgeschichte des In- und Auslandes durch eine möglichst vollständige Sammlung mit größter Sorgfalt ausgeführter, von vorzüglichen Künstlern gezeichneter und in Kupfer und Stahl gestochener treuer Naturgemälde erläutert
Bd.: 2

Leipzig [1834]

4 H.nat. 130 m-1/2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10051272-6